



AGONISTE DES RÉCEPTEURS À LA MÉLANOCORTINE

PT-141

protocole désir & fonction sexuelle

Feuillet patient · Bienfaits & recommandations · Protocole désir + protocole ponctuel



L'ESSENTIEL EN 10 SECONDES

- Agit sur le **cerveau** (système de la mélanocortine) — pas sur les vaisseaux
- Augmente le **désir** et la réponse sexuelle, chez la femme comme chez l'homme
- Injection **sous-cutanée**, environ 1 à 2 h avant le moment souhaité
- Usage ponctuel — possibles nausées passagères et variations de tension

I QU'EST-CE QUE LE PT-141 ?

PT-141
LE PEPTIDE DU DÉSIR

Le PT-141 (Bremelanotide) est un agoniste des récepteurs à la **mélanocortine** : il agit au niveau du **système nerveux central**, sur les circuits du désir, contrairement aux traitements classiques qui agissent sur la circulation sanguine. C'est la 1^{re} molécule de ce type approuvée pour le trouble du désir sexuel chez la femme.

Médicament encadré, avec des effets indésirables possibles (nausées, flush, tension). Réservé à une **prescription et un suivi médical**, sans facteur de risque cardiovasculaire non contrôlé.

II LES BIENFAITS

Désir
LE RETOUR DE L'ENVIE

Rehausse le **désir sexuel** en agissant sur les circuits cérébraux du plaisir.

Action centrale
UNE AUTRE VOIE QUE LA CIRCULATION

Travaille sur le cerveau, quand les traitements classiques agissent sur le flux sanguin.

Chez la femme
LE TROUBLE DU DÉSIR

Réponse documentée sur le trouble de l'intérêt / du désir sexuel (approuvé en Occident).

Chez l'homme
LA FONCTION ÉRECTILE

Peut contribuer à la réponse érectile et au désir en complément des autres approches.

Rapidité d'action
UN EFFET PONCTUEL

Effet dans l'heure suivant l'injection — usage à la demande.

En complément
AVEC LE SUIVI DE FOND

S'associe à la prise en charge des causes (hormones, stress, médicaments).

III RECOMMANDATIONS & MODE D'EMPLOI



Mode d'emploi

RECONSTITUTION · VOIE · CONSERVATION

Reconstitution : flacon reconstitué à l'eau bactériostatique (dilution fournie en consultation)

Voie : injection **sous-cutanée** (abdomen) · **Timing** : environ **1 à 2 h avant** le moment souhaité · **Usage ponctuel**, pas au quotidien · **Conservation** : réfrigéré (2–8 °C).

Éviter de conduire si des nausées surviennent.

IV LES DEUX PROTOCOLES



Protocole désir

USAGE À LA DEMANDE

Objectif : améliorer le désir et la réponse sexuelle de façon ponctuelle.

Dose : dose unique, **1 à 2 h avant** le moment souhaité

Fréquence : usage ponctuel (pas plus d'une fois par période selon accord médical)

Débuter à la plus petite dose efficace

Suivi : tolérance (nausées, tension), effet ressenti.



Protocole de fond associé

TRAITER LES CAUSES

Objectif : traiter durablement les causes du trouble, en complément du traitement ponctuel.

Bilan hormonal (traitement avec thyroïde, hormones, médicaments)

Correction des facteurs : stress, sommeil, médicaments en cause

Le PT-141 ne remplace pas cette démarche de fond

Approche globale : hormones, psychisme, relation, médicaments.

V LES RÈGLES DU PROTOCOLE

BONNES HABITUDES

- ✓ Contextualiser : le désir reste largement psychique et relationnel
- ✓ Sommeil et gestion du stress
- ✓ Bilan hormonal en parallèle
- ✓ Noter effet et tolérance
- ✓ Conserver les flacons au réfrigérateur

À ÉVITER / PRÉCAUTIONS

- ✗ **Jamais d'automédication** : médicament à prescription
- ✗ Ne pas dépasser la dose prescrite
- ✗ Conduire si nausées post-injection
- ✗ Alcool en excès le jour de la prise
- ✗ Hypertension ou maladie cardiovasculaire non contrôlée, grossesse : **contre-indication**

VI VOTRE PARCOURS EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1 · CONSULTATION

Bilan & contre-indications

Évaluation (hormones, tension, médicaments), formation à l'injection, protocole remis.

ÉTAPE 2 · UTILISATION

À la demande

Injection 1 à 2 h avant le moment souhaité, suivi de la tolérance.

ÉTAPE 3 · RÉÉVALUATION

Ajustement

Efficacité, tolérance, décision de la suite et du traitement de fond.

Ce feuillet présente les bienfaits et le mode d'emploi du PT-141.

Médicament à prescription et suivi médical. Posologies indicatives, à individualiser. Ne pas arrêter un traitement prescrit par votre médecin traitant.

Pour toute question : votre prochaine consultation ou le cabinet.

Médecine régénérative