PEPTIDES LABS

DSIP 10 mg

Peptide delta du sommeil — endormissement & sommeil profond | 10 mg en 3 mL



Peptides à usage professionnel
Réservé aux praticiens habilités. Usage expérimental : données humaines anciennes et limitées.

CONCENTRATION	ÉTALON STYLO	DOSE / CLIC
3,33 mg/mL	1 clic = 0,01 mL	33,3 µg

RECONSTITUTION

FLACON	DILUANT	DURÉE D'EMPLOI
10 mg de peptide, lyophilisé	3 mL d'eau bactériostatique	28 jours après reconstitution, 2–8 °C

CLICS / UNITÉS	VOLUME	DOSE TOTALE
3 clics	0,03 mL	100 µg
6 clics	0,06 mL	200 µg
9 clics	0,09 mL	300 µg
12 clics	0,12 mL	400 µg
15 clics	0,15 mL	500 µg

FORMULES DE CONVERSION

Clics = **Volume (mL) ÷ 0,01** · Dose = **Clics × 0,0333 mg**

REPÈRE BAS	TIMING	ASSOCIATION
6 clics ≈ 200 µg	30 à 60 min avant le coucher	Hygiène du sommeil indispensable

Conserver entre 2 °C et 8 °C
28 jours après reconstitution — ne pas congeler

À l'abri de la lumière
Dans son emballage d'origine

LES DEUX PROTOCOLES

P-01

Sommeil

ENDORMISSEMENT · SOMMEIL PROFOND

OBJECTIF	**Améliorer l'endormissement et la qualité du sommeil.**
DOSE	**3 à 9 clics le soir (100 à 300 µg)**
RYTHME	**1 injection/jour, 30–60 min avant le coucher**
CYCLE	**2 à 4 semaines**
PAUSE	**1 à 2 semaines**
SUIVI	**Latence d'endormissement, réveils nocturnes**

P-02

Décalage horaire

VOYAGE · RYTHME

OBJECTIF	**Faciliter la resynchronisation du rythme veille/sommeil.**
DOSE	**3 à 6 clics le soir (100 à 200 µg)**
RYTHME	**Le soir, les premiers jours du décalage**
CYCLE	**5 à 7 jours**
PAUSE	**—**
SUIVI	**Qualité du sommeil, vigilance diurne**

CALENDRIER

ON · 2 à 4 semaines | **PAUSE · 1 à 2 sem.**

Cure courte : le DSIP se juge sur quelques semaines, pas sur un usage continu.

SITES RECOMMANDÉS



ABDOMEN
2 cm autour du nombril. Absorption rapide et régulière.



DELTOÏDE
Tiers inférieur du muscle. Bonne accessibilité.



ROTATION
Alterner les points à chaque injection.



ÉCART MINIMAL
Au moins 2 cm entre deux points consécutifs.



À ÉVITER
Veines visibles, cicatrices, rougeurs, lésions.

CONDUITE DU PROTOCOLE

AVANT LA PREMIÈRE INJECTION

- Bilan et photos de référence
- Vérifier les **allergies** connues
- Grossesse, cancer évolutif : avis médical

PENDANT LE CYCLE

- Injection à heure régulière
- Noter la **tolérance locale**
- Hydratation et hygiène de vie

RÉÉVALUATION

- Photos et mesures comparatives
- Décision de la pause en consultation
- Ne pas enchaîner deux cycles

Conserver entre 2 °C et 8 °C
28 jours après reconstitution — ne pas congeler

À l'abri de la lumière
Dans son emballage d'origine

RÈGLES D'HYGIÈNE

LAVAGE DES MAINS

- Eau et savon, **30 secondes minimum**
- Sécher sur serviette propre ou papier
- **Gel hydroalcoolique** en complément
- **Gants jetables** stériles

DÉSINFECTION DE LA PEAU

- **Swab alcool 70°** sur le site
- Mouvement **circulaire centrifuge**
- Attendre **30 secondes** l'évaporation
- Ne pas souffler sur la zone

MATÉRIEL

- Aiguille **32G · 4 mm**, changée à chaque injection
- Vérifier la **limpidité** de la solution
- Cartouche **dédiée**, étiquette lisible
- Déchets en **conteneur DASRI**

RÉACTIONS POSSIBLES

RÉACTION	FRÉQUENCE	DURÉE	CONDUITE À TENIR
Rougeur au point d'injection	FRÉQUENTE	24–48 h	Compresses froides, surveillance
Douleur / brûlure à l'injection	FRÉQUENTE	Quelques minutes	Injecter plus lentement
Hématome au point d'injection	OCCASIONNELLE	3–7 jours	Glace 10 min, puis compresses chaudes
Nodule sous-cutané	MODÉRÉE	1–3 semaines	Massage doux, espacer les sites
Céphalée, nausée	OCCASIONNELLE	Quelques heures	Antalgique, hydratation, repos
Irritation persistante > 72 h ou induration	MODÉRÉE	> 72 h	Suspendre, avis médical
Réaction allergique (urticaire, dyspnée, gonflement)	RARE	Immédiate	**Appeler le 15 — urgence médicale**

CONSERVATION & PRÉCAUTIONS

STOCKAGE

2 °C à 8 °C, à l'abri de la lumière.
Jamais de congélation.
Durée d'emploi indiquée ci-dessus.

AVANT USAGE

Revenir à **température ambiante** 10–15 min.
Vérifier la limpidité.
Matériel stérile uniquement.

IMPORTANT

Respecter la **pause entre cycles**.
Ne pas partager le stylo.
Signaler toute réaction inhabituelle.

STATUT DES DONNÉES

Peptide innovant à usage expérimental : les données humaines restent limitées. La présence d'une publication n'établit ni l'efficacité ni l'innocuité pour un usage personnel. Le statut réglementaire doit être vérifié.