PEPTIDES LABS

PT-141 (Bremelanotide) 10 mg

Agoniste mélanocortine — désir, usage ponctuel | 10 mg en 3 mL

Peptides à usage professionnel
Réservé aux praticiens habilités. Usage à la demande, jamais quotidien ; ne pas conduire si nausées.

CONCENTRATION	ÉTALON STYLO	DOSE / CLIC
3,33 mg/mL	**1 clic = 0,01** mL	**33,3** µg

RECONSTITUTION

FLACON	DILUANT	DURÉE D'EMPLOI
10 mg de peptide	**3 mL** d'eau bactériostatique	**28 jours** après reconstitution, 2–8 °C

CLICS / UNITÉS	VOLUME	DOSE TOTALE
45 clics	**0,45 mL**	**1,5 mg**
52 clics	**0,52 mL**	**1,73 mg**
60 clics	**0,6 mL**	**2 mg**
70 clics	**0,7 mL**	**2,33 mg**

FORMULES DE CONVERSION

Clics = **Volume (mL) ÷ 0,01** · Dose = **Clics × 0,0333 mg**

REPÈRE	TIMING	PRUDENCE
52 clics ≈ 1,75 mg	**1 à 2 h avant** le moment souhaité	Nausées possibles : **ne pas conduire**

Conserver entre 2 °C et 8 °C
28 jours après reconstitution — ne pas congeler

À l'abri de la lumière
Dans son emballage d'origine

LES DEUX PROTOCOLES

P-01

Désir

USAGE À LA DEMANDE

OBJECTIF	**Améliorer le désir et la réponse sexuelle de façon ponctuelle.**
DOSE	**45 à 60 clics (1,5 à 2 mg)**
RYTHME	**Dose unique, 1 à 2 h avant**
CYCLE	**Usage ponctuel, pas de cure**
PAUSE	**—**
SUIVI	**Tolérance, tension, nausées**

P-02

Tolérance

RECHERCHE DE DOSE MINIMALE

OBJECTIF	**Trouver la dose efficace la plus basse.**
DOSE	**Débuter à 45 clics (1,5 mg), ajuster ensuite**
RYTHME	**1 prise par période, selon accord médical**
CYCLE	**Évaluation sur 2 à 3 prises**
PAUSE	**—**
SUIVI	**Effet, durée, effets indésirables**

CALENDRIER

PONCTUEL | **PAS DE CURE**

Usage à la demande : pas d'administration quotidienne, pas d'enchaînement de prises.

SITES RECOMMANDÉS



ABDOMEN
2 cm autour du nombril. Absorption rapide et régulière.



DELTOÏDE
Tiers inférieur du muscle. Bonne accessibilité.



ROTATION
Alterner les points à chaque injection.



ÉCART MINIMAL
Au moins 2 cm entre deux points consécutifs.

⚠

À ÉVITER
Veines visibles, cicatrices, rougeurs, lésions.

CONDUITE DU PROTOCOLE

AVANT LA PREMIÈRE INJECTION

- Bilan et photos de référence
- Vérifier les **allergies** connues
- Grossesse, cancer évolutif : avis médical

PENDANT LE CYCLE

- Injection à heure régulière
- Noter la **tolérance locale**
- Hydratation et hygiène de vie

RÉÉVALUATION

- Photos et mesures comparatives
- Décision de la pause en consultation
- Ne pas enchaîner deux cycles

❄ **Conserver entre 2 °C et 8 °C**
28 jours après reconstitution — ne pas congeler

☀ **À l'abri de la lumière**
Dans son emballage d'origine

RÈGLES D'HYGIÈNE

LAVAGE DES MAINS

- Eau et savon, **30 secondes minimum**
- Sécher sur serviette propre ou papier
- **Gel hydroalcoolique** en complément
- **Gants jetables** stériles

DÉSINFECTION DE LA PEAU

- **Swab alcool 70°** sur le site
- Mouvement **circulaire centrifuge**
- Attendre **30 secondes** l'évaporation
- Ne pas souffler sur la zone

MATÉRIEL

- Aiguille **32G · 4 mm**, changée à chaque injection
- Vérifier la **limpidité** de la solution
- Cartouche **dédiée**, étiquette lisible
- Déchets en **conteneur DASRI**

RÉACTIONS POSSIBLES

RÉACTION	FRÉQUENCE	DURÉE	CONDUITE À TENIR
Rougeur au point d'injection	FRÉQUENTE	24–48 h	Compresses froides, surveillance
Douleur / brûlure à l'injection	FRÉQUENTE	Quelques minutes	Injecter plus lentement
Hématome au point d'injection	OCCASIONNELLE	3–7 jours	Glace 10 min, puis compresses chaudes
Nodule sous-cutané	MODÉRÉE	1–3 semaines	Massage doux, espacer les sites
Céphalée, nausée	OCCASIONNELLE	Quelques heures	Antalgique, hydratation, repos
Irritation persistante > 72 h ou induration	MODÉRÉE	> 72 h	Suspendre, avis médical
Réaction allergique (urticaire, dyspnée, gonflement)	RARE	Immédiate	**Appeler le 15 — urgence médicale**

CONSERVATION & PRÉCAUTIONS

STOCKAGE

2 °C à 8 °C, à l'abri de la lumière.
Jamais de congélation.
Durée d'emploi indiquée ci-dessus.

AVANT USAGE

Revenir à **température ambiante** 10–15 min.
Vérifier la limpidité.
Matériel stérile uniquement.

IMPORTANT

Respecter la **pause entre cycles**.
Ne pas partager le stylo.
Signaler toute réaction inhabituelle.

STATUT DES DONNÉES

Peptide innovant à usage expérimental : les données humaines restent limitées. La présence d'une publication n'établit ni l'efficacité ni l'innocuité pour un usage personnel. Le statut réglementaire doit être vérifié.